

유방의 유두상 병변: 초음파 유도하 14-게이지 자동총생검법과 11-게이지 진공흡인생검법의 비교

고은숙 · 조나리야 · 양상규 · 김도연 · 문우경

서울대학교 의과대학 방사선과학교실, 방사선의학연구소

목적: 유방의 유두상 병변에 대한 초음파 유도 하 14-게이지 자동총생검법과 11-게이지 진공흡인생검법의 성적을 비교하고자 한다.

대상 및 방법: 2003년 1월부터 2005년 4월까지 초음파 유도 하 핵 생검법을 시행한 1723개의 병변 중 98개 (5.7%)가 병리학적으로 유두상 병변으로 보고되었다. 이 중에서 65개는 14-게이지 자동총생검법으로 33개는 11-게이지 진공 흡인 생검법으로 진단되었다. 14-게이지 자동총생검법을 시행 받은 군 중의 54%(35/65)와 11-게이지 진공흡인 생검법을 시행 받은 군 중 15%(5/33)가 절제생검을 받았다. 두 군의 병리소견과 함께 수술 소견, 그리고 추적검사 소견을 분석하고 두 군간의 조직학적 저평가율(histologic underestimation rate)과 재조직검사율(repeat biopsy rate)을 비교하였다. 재조직검사율은 수술을 한 양성과 비정형 병변, 진단이 불확실한 병변의 합을 전체 양성과 비정형 병변, 진단이 불확실한 병변의 합으로 나누어서 구했다. 비정형 관상피 증식증 저평가(ADH underestimation)는 핵 생검에서 비정형성 유두종이 나왔으나 수술에서 암이 나온 경우로 관상피내암 저평가(DCIS underestimation)는 핵 생검에서 관상피내암이 나왔으나 수술에서 침윤성 암이 나온 경우로 정의했다.

결과: 재조직검사율은 14-게이지 자동총생검법의 경우 47%(27/57) 였으며 11-게이지 진공흡입생검법의 경우 9.7%(3/31) 였다. 비정형 관상피 증식증 저평가는 14-게이지 자동총생검법에서 50%(6/12) 였으며 11-게이지 진공흡입생검법에서는 0%(0/4)였다. 관상피내암 저평가는 14-게이지 자동총생검법의 경우 14%(1/7) 였으며 11-게이지 진공흡입생검법의 경우 0%(0/2)였다.

결론: 유방의 유두상 병변에 대한 초음파 유도 하 11-게이지 진공흡입생검법이 14-게이지 자동총생검법보다 조직학적 저평가율과 재조직검사 측면에서 성적이 더 우수하다.

Index words: Breast, biopsy
Breast, US
Breast, neoplasm

서 론

유방의 유두상 병변은 비교적 드문 질환으로 조직검사를 시행하는 양성종양의 10%, 악성종양의 1-2%를

차지하며 (1-4) 절제생검과 경피적 핵 생검 모두에서 병리학적으로 정확한 진단이 어렵다고 알려져 있다 (5). 따라서 대부분의 경우 외과적 절제 생검으로 진단이 이루어져 왔다 (6). 그러나 최근에 유두상 병변을 진단하고 치료하는데 있어 병리 결과와 영상 소견이 일치한다면 수술적 절제 없이 경피적 핵 생검으로도 충분하다는 보고들이 있다 (7, 8). 입체정위 유도 하에서는 11-게이지 진공흡인생검법이 14-게이지 자동총생검법보다 조직학적 저평가율이나 재조직검사율이 낮아 더 효과적인

통신저자 : 문 우 경
서울대학교 의과대학 방사선과학교실, 서울시 종로구 연건동 28번지
Tel. (02)2072-3928, Fax.(02)743-6385
E-mail: moonwkw@radcom.snu.ac.kr

것으로 알려져 있다 (9-13). 그러나 초음파 유도 하 14-게이지 자동총생검법에 대한 11-게이지 진공흡인 생검법의 이점에 대해서는 아직 밝혀진 바가 없다 (14). 초음파 유도 하에서 11-게이지 진공흡인생검법이 14-게이지 자동총생검법보다 조직학적 저평가, 재조직검사, 위음성률에서 더 유용하다는 보고가 있으나 통계학적으로는 차이가 없었다 (15). 더욱이 유두상 병변을 진단하고 치료하는 데 있어 초음파 유도 하 14-게이지 자동총생검법에 대한 11-게이지 진공흡인 생검법의 이점에 대해서는 아직 밝혀진 바가 없다. 이 연구에서 저자들은 유두상 병변을 진단하고 치료하는 데 있어 초음파 유도 하에 14-게이지 자동총생검법을 시행한 군과 11-게이지 진공흡인 생검법을 시행한 군의 성적을 비교하고자 하였다.

대상 및 방법

2003년 1월부터 2005년 4월까지 행해진 1723개의 병변에 대한 초음파 유도 하 경피적 생검 중 유두종, 유두종증(papillomatosis), 비정형 유두종, 비침윤성 유두상암, 침윤성 유두상암을 포함한 모든 유두상 병변을 대상으로 하였다 (6). 그러나 예외적으로 양성과 악성 어느 쪽의 진단 기준에도 부합하지 않을 경우, 병리의사의 판단에 따라 편의상 ‘비특이적 유두상 종양’ (nonspecific papillary neoplasm) 으로 분류하였다. 미세유두상 관상피내암(micropapillary DCIS)과 침윤성 미세유두상암(invasive micropapillary carcinoma)은 연구대상에 포함되지 않았다.

이 기간 동안 행해진 1723 건의 조직검사 중 유두상 병변으로 진단된 경우는 98(5.7%)개였다. 이들 중 65개는 14-게이지 자동 총(Pro-Mag 2.2, Manan Medical Products, Northbrook, Ill, USA)을 이용했으며 33개는 11-게이지 진공흡인 생검법(Mammotome; Ethicon-Endosurgery, Cincinnati, OH, USA)을 이용해 진단되었다. 조직검사 방법은 임상 의사와 환자의 선호도 반영되었지만 조직검사를 시행하는 방사선과 의사의 판단에 의해 주로 결정되었다. 모든 조직검사는 환자가 바로 눕거나 비스듬히 누운 상태에서 10- 또는 12-MHz의 고해상도 선형 탐촉자(Kretz-Medison, Seoul; HDI 5000, Advanced Technology Laboratories, Bothell, WA, USA)를 이용했다. 평균 조직 수는 14-게이지 자동총생검법의 경우 5.48(범위, 3-10)개였고 11-게이지 진공흡입생검법의 경우 9.8(범위, 4-20)개였다.

65개의 14-게이지 자동총생검법 결과 42개는 양성(유두종이 41개, 유두종증이 1개), 13개는 비정형성 병

변(비정형성 유두종 또는 양성 병변이면서 비정형성을 보이는 병변)이었고 8개가 악성(유두상 관상피내암이 7개, 침윤성 유두상암이 1개)이었다. 나머지 2개는 어느 군에도 포함되지 않는 비특이적인 유두상 종양이었다 (Table 1).

33개의 11-게이지 진공흡인 생검법 결과 27개가 양성(유두종이 25개, 유두종증이 2개), 4개가 비정형성 병변(비정형성 유두종 또는 양성 병변이면서 비정형성을 보이는 병변)이었으며 2개가 악성(모두 유두상 관상피내암)이었다 (Table 1).

조직검사 결과 비정형성이나, 관내 또는 침윤성 암이 포함된 경우는 모든 예에서 외과적 절제를 권고하였다. 양성 병변이라도 병리의사나 임상 의사 또는 환자가 원하는 경우 외과적으로 절제되었다. 양성인 병리결과가 영상소견과 부합한다면 6, 12, 24 개월의 추적검사를 권고했다. 전체 69개의 양성 병변 중 30개(43.5%)에서 유방촬영 또는 초음파 추적검사가 이뤄졌으며 각각 14-게이지 자동총생검법의 경우 42개 중 14(33.3%)개에서 11-게이지 진공흡인 생검법의 경우 27개 중 16(59.3%)개에서였다. 14-게이지 자동총생검법을 시행한 한 개의 비정형 병변은 수술도 추적검사도 이루어지지 않았다. 평균 추적 기간은 14-게이지 자동총생검법의 경우 11.3개월, 11-게이지 진공흡인 생검법의 경우 12.6개월이었다.

“조직학적 저평가”란 경피적 생검 결과는 비정형 관

Table 1. Histology at Core Biopsy

	Gun*	VA†
Benign	42	27
Atypical	13	4
Malignant	8	2
Nonspecific papillary neoplasm	2	0
Total	65	33

*Gun; 14-gauge automated gun biopsy

† VA; 11-gauge vacuum-assisted biopsy

Table 2. Causes of Surgical Excision after Core Biopsy

	Gun*	VA†
Cancer	8	2
Atypia	12	2
Uncertain pathology	2	1
Therapeutic	13	0
Total	35	5

*Gun; 14-gauge automated gun biopsy

† VA; 11-gauge vacuum-assisted biopsy

상피 증식증(ADH)이었으나 수술에서 암이 나온 경우(ADH underestimation) 또는 경피적 생검 결과는 관상피내암(ductal carcinoma in situ, DCIS)가 나왔으나 수술에서 침윤성 암으로 나온 경우(DCIS underestimation)로 정의한다 (12, 16, 17). 저평가율은 수술을 한 각각의 고위험 병변 중 수술에서 암이 나온 수를 수술을 한 전체 고위험 병변의 수로 나누어서 구했다. 재조직검사가 이뤄진 경우 처음 조직검사와의 시간 간격과 그 이유를 조사하였다. 즉각적 재조직검사(immediate rebiopsy)란 첫번째 영상 추적검사가 이뤄지기 전 재조직검사가 시행되는 경우를 말하고 지연 재조직검사(delayed rebiopsy)란 첫번째 영상 추적검사 후 재조직검사가 이뤄지는 경우를 의미한다. 재조직검사가 이뤄지는 이유로는 고위험 병변, 불충분한 검체, 영상-조직소견 간 불일치(discordance), 추적영상에서 병변의 진행 등이 있을 수 있다. 재조직검사율은 재조직검사 수를 전체 양성 병변, 비정형 병변, 진단이 불확실한 병변, 추적검사에서 진행이 있는 병변의 합으로 나눠서 구했다 (13). 14 - 게이지 자동총생검법군과 11 - 게이지 진공흡인 생검법군 간의 조직학적 저평가와 재조직검사율을 비교하였다.

결 과

14 - 게이지 자동총생검법의 경우 65개 중 35개에서 수술을 했으며 (53.8%, 양성 13/42, 비정형성 12/13, 악성 8/8, 비특이적 유두상 종양 2/2) 11 - 게이지 진공흡인 생검법의 경우 33개 중 5개에서 수술을 했다 (15.2%, 양성 1/27, 비정형성 2/4, 악성 2/2) (Table 2). 전체 양성 병변 69개 중 25개(36.2%, 14 - 게이지 자동 총에서

15개, 11 - 게이지 진공흡인 생검법에서 10개)는 추적검사도 수술도 이뤄지지 않았다. 14 - 게이지 자동총생검법 결과 양성이었던 13개의 병변 중 수술 후 악성으로 바뀐 경우는 없었으나 양성 유두종이었던 2개에서 수술 후 비정형성 유두종으로 바뀌었다. 12개의 비정형성 병변은 수술 결과 비정형성 유두종 5개, 비정형성이 없는 양성 병변 1개, 유두상 관상피내암 4개, 침윤성 암 2개였다. 8개의 악성 병변은 수술 결과 유두상 관상피내암 5개, 비정형성 유두종 1개, 침윤성 암 2개였다. 나머지 2개의 비특이적 유두상 종양은 각각 비정형성 유두종과 유두상 관상피내암으로 밝혀졌다. 11 - 게이지 진공흡인 생검법에서 양성이면서 수술한 1개의 유두종증의 경우 수술 후에도 양성이었다. 3개의 비정형성 병변은 수술 결과 양성 유두종 2개, 섬유선종 1개였다. 11 - 게이지 진공흡인 생검법에서 비정형성으로 나온 나머지 두 개의 병변은 영상 추적검사에서 병변의 진행을 보이지 않고 안정적이었다. 2개의 유두상 관상피내암은 수술 후에도 유두상 관상피내암 이었다. 두 군의 핵 생검과 수술 후 병리 소견을 요약하면 각각 Table 3, 4와 같다.

14 - 게이지 자동총생검법의 경우 양성인 병변 13개와 비정형성 병변 12개, 비특이적 유두상 종양 2개에서 재조직검사가 시행되었으며 모든 예에서 즉각적 재조직검사가 됐다. 재조직검사의 이유는 Table 2와 같다. 비특이적 유두상 종양의 경우 진단이 분명하지 않은 경우이므로 재조직검사군에 포함되었다. 11 - 게이지 진공흡인 생검법의 경우 양성 병변 1개와 비정형성 병변 2개에서 재조직검사가 이뤄졌고 역시 모두 즉각적 재조직검사가 됐다. 재조직검사율은 14 - 게이지 자동총생검법의 경우 47% (27/57)였고 11 - 게이지 진공흡인생검법의 경우 9.7%(3/31)였다. ADH underestimation은 14 - 게이지

Table 3. Surgical Findings of 14-Gauge Automated Gun Biopsy

Histologic findings at core biopsy (14-gauge)	Benign	Atypical	DCIS	Invasive carcinoma
Benign (n=13)	11	2	0	0
Atypical (n=12)	1	5	4	2
DCIS (n=7)	0	1	5	1
Invasive carcinoma (n=1)	0	0	0	1
Nonspecific papillary neoplasm (n=2)	0	1	1	0

Note. — DCIS= ductal carcinoma in situ

Table 4. Surgical Findings of 11-Gauge Mammotome biopsy

Histologic findings at core biopsy (11-gauge)	Benign	Atypical	DCIS	Invasive carcinoma
Benign (n=1)	1	0	0	0
Atypical (n=2)	2	0	0	0
DCIS (N=2)	0	0	2	0
Invasive carcinoma (n=0)	0	0	0	0

자동총생검법의 경우 50%(6/12)였고 11-게이지 진공 흡입생검법의 경우 0%(0/4)였다. DCIS underestimation의 경우 14-게이지 자동총생검법의 경우 14%(1/7)였고 11-게이지 진공흡인 생검법의 경우 0%(0/2)였다.

고 찰

유두상 병변은 섬유혈관줄기를 가지며 유관 내로 돌출하는 유두 모양의 상피세포의 증식이다 (6, 18). Haagensen 등 (19)은 유두상 종양을 양성 관내 유두종과 악성 유두상암의 두 가지 주된 형태로 나눴다. Tavassoli (6)는 유두상 병변을 더 넓은 스펙트럼으로 나눴다. 여기에는 유두종, 유두종증, 경화성 유두종 (sclerosing papilloma), 그리고 비정형 유두종이 포함된다. 또한 유두종에서 발생한 암(carcinoma arising in a papilloma), 유두상 관상내피암, 침윤성 유두상암도 포함된다. 이들 병변간은 형태학적으로 유사한 양상을 보이기 때문에 이들을 병리조직학적 소견으로 양성과 악성 병변을 감별하는 것은 어려우며 판단할 조직의 양이 적을 경우 더욱 그러하다. Tavassoli(6)는 유두상 병변에서 양성 병변을 악성 병변과 구별하는 가장 중요한 요소는 병변의 강 내쪽을 따라 존재하는 한 층의 myoepithelial cell의 존재라고 하였다.

가장 흔한 양성 유두상 종양은 유두종으로 엽상의 섬유혈관 기질과 증식성의 유관 상피세포로 구성된다 (1). 유두종은 유륜하의 큰 유관에서 또는 유방 말초부위의 작은 유관에서 발견될 수 있다 (6, 18). 단일성 유두종은 대부분 중심부에 위치하며 유방촬영에서 잘 보이지 않으며 종종 유즙분비와 관련이 있다. 말초 유두종은 더 흔하게 말초부위에 위치하며 무증상인 경우가 많다 (20). 다발성 말초 유두종이 있는 여성의 경우 유방암의 발생 위험이 높아진다는 주장도 제기되고 있다 (6). 유두상암은 전체 유방암의 2% 이내로 주로 유두상 관상내피암으로 나타난다 (6, 21).

본 연구에서는 영상 유도 하 조직검사의 5.7%가 유두상 병변으로 3%였던 Liberman 등 (7)이나 4.9%였던 Mercado 등 (22)의 보고보다 약간 높게 나타났고 조직 검사에서 양성 유두상 병변이 나온 경우 수술적 절제 없이 임상적 또는 영상 추적검사로 안전하게 관리할 수 있다는 이전에 나온 보고들과도 일치한다 (7, 22). 14-게이지 자동총생검법과 11-게이지 진공흡인 생검법 모두에서 양성으로 나온 병변이 수술 후 악성으로 밝혀지는 경우는 하나도 없었다. 따라서 이전의 보고들과 종합해 볼 때 핵 조직검사서 비정형성을 포함하지 않는 양성 유두상 병변으로 진단된 경우 즉각적인 외과적 절제의

필요 없이 영상 추적검사로도 안전하게 관리할 수 있다. 그러나 비정형성 병변의 경우 두 군 합쳐서 7(41.2%, 7/17) 개의 병변이 수술 후 DCIS나 침윤성 암으로 밝혀졌으며 7개 모두 14-게이지 자동총생검법을 한 경우였다. 따라서 조직검사 결과 비정형 유두종이나 비정형성을 가진 유두상 병변이라면 특히 14-게이지 자동총생검법의 경우 반드시 수술적 절제를 필요로 한다.

조직검사에서의 저평가는 검사 특성상 피하기 힘든 제한점으로 잘 알려져 있다 (23, 24). 14-게이지 자동총생검법으로 비정형성으로 나와 수술을 시행한 12개 중 6개(50%)가 수술 후 유두상 관상내피암이나 침윤성 암으로 바뀌었다. 그러나 11-게이지 진공흡인 생검법의 경우 수술 후 암으로 나온 경우가 없었다(0%). 유사하게 14-게이지 자동총생검법에서 유두상 관상내피암으로 나온 7개 중 한 개(14.3%)가 수술 후 침윤성 암으로 밝혀졌으나 11-게이지 진공흡인 생검법의 경우 2개 모두 수술 후에도 관상내피암이었다. 이런 조직학적 저평가는 획득하는 조직의 양을 늘리거나, 더 굵은 게이지의 바늘을 이용하거나, 진공흡인 생검법을 사용하면 줄어 들 것으로 생각된다 (12). 따라서 조직학적 저평가를 줄이기 위해서는 11-게이지 진공흡인 생검법의 사용이 요구된다.

그러나 두 군의 전체 수가 11-게이지 진공흡인 생검법이 작으며 특히 비정형성과 악성 병변이 각각 4개, 2개로 작게 포함되었다. 따라서 저평가율이 다소 과장되었을 수 있다. 또한 맘모톰 조직검사가 작은 병변과 미세석회화 검출에 주로 사용되어 큰 종괴의 경우 자동 총을 많이 이용하므로 자동 총에서 저평가율이 과장될 수 있다. 이상은 본 연구의 제한점으로 생각된다.

결론적으로 조직검사 결과가 양성이라면 수술적 절제 없이 영상추적 만으로도 안전하게 관리될 수 있다. 그러나 비정형성 병변이라면 조직학적 저평가의 위험 때문에 수술적 절제가 요구된다. 또한 14-게이지 자동총생검법에 비해 11-게이지 진공흡인 생검법이 조직학적 저평가와 재조직검사 측면에서 성적이 우수하였다. 조직학적 저평가를 줄이기 위해 유두상 병변이 의심되는 경우 11-게이지 진공흡인 생검법이 반드시 권고되어야 한다.

참 고 문 헌

1. Rosen PP. Benign papillary tumors. In: Rosen PP, ed. Rosen's breast pathology. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997:67-104
2. Rosen PP. Papillary carcinoma. In: Rosen PP, ed. Rosen's breast pathology. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997:335-354
3. Gadd MA. Papillary lesions. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Hellman S, eds. Diseases of the breast. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996:42-45

4. Haagensen CD. Solitary intraductal papilloma. In: Haagensen CD, ed. Diseases of the breast. Philadelphia: Saunders, 1986:136-175
5. Ellis IO, Elston CW, Pinder SE. Papillary lesions. In: Elston CW, Ellis IO eds. The breast, 3rd ed, vol. 3, Chapter 8, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1998;133-146
6. Tavassoli FA. Papillary lesions. In: Tavassoli FA, ed. Pathology of the breast. Norwalk; Conn: Appleton & Lange, 1992;193-227
7. Liberman L, Bracero N, Vuolo MA, et al. Percutaneous large-core biopsy of papillary breast lesions. AJR Am J Roentgenol 1999; 172:331-337
8. Philpotts LE, Shaheen NA, Jain KS, Carter D, Lee CH. Uncommon high-risk lesions of the breast diagnosed at stereotactic core-needle biopsy: clinical importance. Radiology 2000; 216:831-837
9. Philpotts LE, Lee CH, Horvath LJ, et al. Underestimation of breast cancer with 11-gauge vacuum suction biopsy. AJR Am J Roentgenol 2000;175:1047-1050
10. Jackman RJ, Burbank F, Parker SH, et al. Atypical ductal hyperplasia diagnosed at stereotactic breast biopsy: improved reliability with 14-gauge, directional, vacuum-assisted biopsy. Radiology 1997;204:485-488
11. Philpotts LE, Shaheen NA, Carter D, Lange RC, Lee CH. Comparison of rebiopsy rates after stereotactic core needle biopsy of the breast with 11-gauge vacuum suction probe versus 14-gauge needle and automatic gun. AJR Am J Roentgenol 1999;172:683-687
12. Burbank F, Stereotactic breast biopsy of atypical ductal hyperplasia and ductal carcinoma in situ lesions: improved accuracy with a directional, vacuum-assisted biopsy instrument. Radiology 1997;202:843-847
13. Jackman RJ, Nowels KW, Rodriguez-Soto J, Marzoni FA, Finkelstein SI, Shepard MJ. Stereotactic, automated, large-core needle biopsy of nonpalpable breast lesions: false-negative and histologic underestimation rates after long-term follow-up. Radiology 1999;210:799-805
14. Philpotts LE, Hooley RJ, Lee CH. Comparison of automated versus vacuum-assisted biopsy methods for sonographically guided core biopsy of the breast. AJR Am J Roentgenol 2003;180:347-351
15. Cho N, Moon WK, Cha JH, et al. Sonographically guided core biopsy of the breast: comparison of 14-gauge automated gun and 11-gauge directional vacuum-assisted biopsy methods, Korean J Radiol. 2005;6(2):102-109
16. Liberman L, Derchaw DD, Glassman J, et al. Analysis of cancers not diagnosed at stereotactic core breast biopsy. Radiology 1997;203:151-157
17. Burbank F, Parker SH. Methods for evaluating the quality of an image-guided breast biopsy program. In: Parker SH, ed. Interventional Breast Procedures. Philadelphia: Saunders; 1998:71-83. Feig SA, ed. Seminars in Breast Disease; vol. 1, no. 2
18. Page DL. Papilloma and related lesions. In: Page DL, Anderson TJ, eds. Diagnostic histopathology of the breast. Edinburgh, Scotland; Churchill Livingstone, 1987;104-119
19. Haagensen CD, Stout AP, Phillips JS. Papillary neoplasms of the breast. I. Benign intraductal papilloma. Ann Surg 1951;133:18-36
20. Cardenosa G, Eklund GW. Benign papillary neoplasms of the breast: mammographic findings. Radiology 1991;181:751-755
21. Schneider JA. Invasive papillary breast carcinoma: mammographic and sonographic appearance. Radiology 1989;171:377-379
22. Mercado CL, Hamele-Bena D, Singer C, et al. Papillary lesions of the breast: evaluation with stereotactic directional vacuum-assisted biopsy. Radiology 2001;221:650-655
23. Lee CH, Carter D, Philpotts LE, et al. Ductal carcinoma in situ diagnosed with stereotactic core needle biopsy: can invasion be predicted? Radiology 2000;217:466-470
24. Jackman RJ, Burbank F, Parker SH, et al. Stereotactic breast biopsy of non-palpable lesions: determinants of ductal carcinoma in situ underestimation rates. Radiology 2001;218:497-502

Papillary Lesions of the Breast: Comparison of US-guided 14-Gauge Automated Gun and 11-Gauge Directional Vacuum-Assisted Biopsy Methods

Eun Sook Ko, M.D., Nariya Cho, M.D., Sang-Kyu Yang, M.D., Do Youn Kim, M.D.,
Woo Kyung Moon, M.D.

*Department of Radiology, College of Medicine Seoul National University and The Institute of Radiation Medicine,
Seoul National University Medical Research Center*

Purpose: To compare the outcomes of US-guided 14-gauge automated and 11-gauge vacuum-assisted biopsy for the papillary lesions of the breast.

Materials and Methods: A retrospective review of US-guided core biopsies of 1723 consecutive breast lesions between January 2003 and April 2005. Ninety-eight lesions (5.7%) were reported pathologically as papillary lesions. The biopsies were performed with using a 14-gauge automated gun on 65 lesions or with using an 11 gauge vacuum-assisted device on 33 lesions. Thirty-five lesions (54%, 35/65) of 14-gauge automated gun and 5 lesions (15%, 5/33) of 11-gauge vacuum-assisted biopsy underwent surgery. The histologic findings were compared with the surgical, imaging and follow-up findings. The histologic underestimation rate, the repeat biopsy rate, and the false negative rates were compared between the two groups. The repeat biopsy rate was determined by dividing total number of excisional biopsy of benign lesion, high-risk lesion and uncertain diagnosis into the total number of those lesions. An "ADH underestimation" was defined as a lesion yielding atypical ductal hyperplasia at percutaneous biopsy and carcinoma at surgery and "DCIS underestimation" was defined as a lesion yielding ductal carcinoma in situ at percutaneous biopsy and invasive carcinoma at surgery.

Results: The repeat biopsy rate was 47% (27/57) for 14-gauge automated gun biopsy and 9.7% (3/31) for 11-gauge vacuum-assisted biopsy. ADH underestimation was 50% (6/12) for the 14-gauge automated gun biopsy and 0% (0/4) for the 11-gauge vacuum-assisted biopsy. DCIS underestimation was 14% (1/7) for the 14-gauge automated gun biopsy and 0% (0/2) for the 11-gauge vacuum-assisted biopsy device. The false negative rate was 0% in these two groups.

Conclusion: For the papillary lesions of the breast, the outcomes of the US-guided core biopsies performed with the 11-gauge vacuum-assisted device were better than those outcomes of the biopsies performed with the 14-gauge automated gun, in terms of underestimation and repeat biopsy.

Index words: Breast, biopsy
Breast, US
Breast, neoplasm